ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Un homme de 30 ans tomba en devant et de six
pieds de haut les doigts de la main droitte
furent renversés du Coté de l'extention, les
Tendons flechisseurs des doigts indicateurs et
medius se rompirent totalement les ligamens
de la jointure la peau meme furent dechirées
de maniere que les tetes des os du metacarpe et
les bouts des tendons qui etoient restés aux doigts
sortoient par la playe, les portions superieures
de ces tendons tenans au muscles etoient couverts
elle est ~~[illegible]~~ estoit dechirée ~~en partie~~
de la peau parce que ~~[illegible]~~ ~~elle en~~
vis a vis de la jointure, et que les tendons s'estoient rompus
~~ne s'etoit pas faitte vis a vis tendroit de la~~
beaucoup plus haut ~~que la peau~~ d'
~~rupture des tendons Celle en etoit plus haute~~
~~et Cette de la peau plus basse~~ pour procurer la
reunion de ces tendons rompus; je flechis peu a peu
les ~~tendons~~ digts en meme tems que je Conduisois
avec douceur les bouts des tendons pour les
engager a se joindre et s'aproximer. Je mis
sur la playe un plumaceau trempé dans l'eau
de vie, j'envelopai la main d'une simple
Compresse je pris une boulle de charpie de

ARC 61 n°6

la grosseur dune grosse plume, que je mis dans
la main, tant pour apuier lapareil que pour
soutenir, et maintenir les doigts flechis~~[illegible]~~ et en
repos, jenvelopay le tout avec des Compresses
mouillées deau de vie, lune et lautre furent
assujetis avec une bande et plassé dans une
écharpe a lordinaire.

Pour prevenir les accidens qui suivent ordinairement une
aussi grande maladie, on fit observer, le repos
la diette, et lon saigna copieusement le malade,
le premier apareil ne fut levé que le quatrième
jour parce que le malade ne souffroit point ~~mais~~
on ~~humectoit quatre ou cinq fois par jour tout~~
~~lapareil avec une decoction emolliente animée~~
~~dun tiers deau de vie~~; lors quon decouvrit la
main, on trouva la reunion trés

Trés avancée, on appliqua un appareil semblable au premier, et quon ne leva que six jours apprés alors on trouva la reunion faitte, on gena moins les doigts, et lon permit au Malade de les mouvoir doucement sur la plotte de Charpie, que lon fit meme un peu moins grosse que la precedente afin que les doigts ussent plus détendue pour se mouvoir, Enfin le vingtieme jour on leva tout lappareil pour ne metre quun simple ~~bandage~~ bandage la main fut mise dans une mitene de peau de lievre pour la tenir Chaudement, et pour que le malade put faire a son gré tous les mouvemens, et acoutumer insensiblem.t ses doigts a leurs fonctions ordinaires ces moiens reussirent si parfaitement, qua peu de Chose prés la main fait toutes ses fonctions.

Jay vu la rupture des tendons avec M.r Serier mon Confrere a un sauteur de la foire S.t Germain qui setoit rompu, les tendons flechisseurs, des quatre doigts de la main, il fut pencé a peu prés de la meme maniere, et il fut gueri parfaitement, on a

ARC 61 n°6
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

pu lire les observations que jai donné sur la
rupture de tendons encore plus considerable que
ceux cy, aussi nai je point pretendu les anoncer
comme choses extraordinaires je ne parle de ces
maladies quautant quil ma paru necessaire de
faire pour les pouvoir comparer a dautres qui nont
pas eu le meme succés.

Une danseuse de corde de la foire St. ~~Germain~~
Laurens setant elevée fort haut, en retombant sur
la corde napuia que le bout du gros orteil du
pied gauche, et se cassa le tendon flechisseur; la
portion de la aponevrose qui acompagne ce tendon
jusqua lextremité de lorteil la peau meme fut
rompue en travers, et larticulation etoit decouverte
je ni fus apellé que le huitieme jour de cet accident
une tension considerable de tout le pied et de la
jambe jusquau genoüil, une douleur insuportable
la fievre linsomnie, et autres simptomes etoient
a craindre pour la vie de la malade, elle en
fut quitte cependant pour quelque depots en

differents endroits du pied et de la jambe dont
elle fut guerie par les remedes et operations que
je ne rapporte point parce que mon dessain dans
ce memoire est de proposer seulement les moiens
deviter ces accidens en procurant une reunion
prompte et facille des tendons rompus en les
raprochant promptement, et en maintenant les
parties etenduës ou flechies, dans leur dernier
degre dextension si les tendons extenseurs sont
rompus, ou dans leur dernier degré de flexion
si la rupture sest faite aux flechisseurs; cest
ce que lon navoit point fait a la malade dont
il sagit, le gros orteil, navoit point été plié
laproche des bouts des tendons navoit ~~pa~~ pu
se faire, le sang ou la sinovie des tendons et
de larticulation avoit été exposés a lair, et
ces sucs alterés avoient Causés tous les desordres

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE